

DMSA 200 HYPOALLERGEN

ACHTUNG

Bei Vorliegen von MS-Herden ist die
Einnahme von DMSA kontraindiziert!
Zur Sicherheit des Patienten
sollte eine ärztliche Abklärung
nicht unterlassen werden.

- Zusammensetzung:** Eine Kapsel enthält:
meso-2, 3-Dimercaptosuccinylsäure 200 mg
- Herstellung:** Wir verzichten bei der Herstellung der Kapseln bewußt auf den Einsatz von Hilfsstoffen, fließverbessernden Zusätzen und Farbstoffen. Eine Konservierung der Ausgangsstoffe wird vermieden. Diese Verarbeitungstechnik ermöglicht eine optimale Verträglichkeit auch bei allergisch disponierten Personen.
- Eigenschaften:** Dimercaptosuccinylsäure (DMSA) ist ein oral wirksamer Chelatbildner. DMSA bindet zweiwertige Metalle und Schwermetalle und wird als wasserlöslicher Chelatkomplex hauptsächlich renal ausgeschieden.
- Anwendungsgebiete:**
- 1) Chronische und akute Vergiftungen mit Quecksilber (anorganische und organische Verbindungen, Quecksilberdampf, metallisches Quecksilber).
 - 2) Chronische Vergiftung mit Blei.
 - 3) Es gibt Hinweise dafür, daß DMSA auch geeignet ist zur Steigerung der Ausscheidung (Elimination) bei Vergiftungen mit
 - Arsen (ausgenommen Vergiftungen mit Arsenwasserstoff)
 - Kupfer
 - Antimon
 - Chrom
 - Kobalt.
- Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Dimercaptosuccinylsäure (DMSA).
Da keine teratogenen Untersuchungen vorliegen, wird von der Einnahme während der Schwangerschaft dringend abgeraten.
- Nebenwirkungen:** Gelegentlich können Hautreaktionen vermutlich allergischer Natur, wie Juckreiz, oder Hautausschlag (Exanthem, Rash) auftreten, die nach Absetzen der Therapie in der Regel reversibel sind.
Vor allem bei länger andauernder Anwendung kann DMSA den Mineralstoffhaushalt, insbesondere die Elemente Zink und Kupfer, beeinflussen. Es wird empfohlen, bei längerer Einnahme die genannten Mineralstoffe zu substituieren. In Einzelfällen kann eine Erhöhung der Transaminasen festzustellen sein.
In seltenen Fällen: Thrombocytopenie, Leukopenie.
- Wechselwirkungen:** Die gleichzeitige Gabe von kohlehaltigen Präparaten sollte vermieden werden, da mit einer verminderten Resorption von DMSA gerechnet werden muß und damit einer Beeinträchtigung der Wirksamkeit.
- Dosierungsanleitung:** Die Dosierung richtet sich grundsätzlich nach Art und Schwere der Vergiftung.
Einnahme nur nach ärztlicher Vorschrift. Die Therapiedauer ist abhängig vom klinischen Bild und dem laboranalytischen Befund. Kapseln mit Wasser einnehmen.
Hinweis für Diabetiker: Für Diabetiker geeignet. Keine Anrechnung auf Broteinheiten.

Arzneimittel sorgfältig aufbewahren. Vor Kindern sicher aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.